

Кір – одне з найрозповсюдженіших гострих інфекційних захворювань дитячого віку, а в даний час і серед дорослого населення. Джерелом зараження є хвора людина, частіше дитина з першого дня захворювання. Якщо кір перебігає з ускладненнями, то хворий може бути джерелом зараження протягом 10 днів з моменту появи висипу.

До кору існує загальна сприйнятливість. Із 100 здорових дітей, котрі спілкуються із хворим, можуть захворіти 95.

З моменту зараження до появи перших ознак проходить інкубаційний період тривалістю до 17 – 18 днів, частіше 10 – 12.

Після тривалого періоду настає катаральний, що триває 3 – 4 дні. Основними ознаками його є підвищення температури, кашель, нежить, чхання, захриплість голосу, почервоніння очей, слізозотеча, світобоязнь. Дитина стає вередливою, подразливою, плаксивою, погано їсть, спить. При типовій формі кору через 1 – 2 дні з'являється дуже важлива для ранньої діагностики захворювання ознака, характерна для кору – дрібні плями білувато – сіруватого кольору, що розміщуються на слизових оболонках щік, губ, іноді вій. Температура через 1 – 2 дні може знизитись, а на 4 – 5 день відпочатку хвороби знову підвищиться. Разом з цим виявляється наступний цикл хвороби – в період висипання. Висип – плямисто папульозний (плями немовби здіймаються над поверхнею) різного кольору – від блідо – рожевого до яскраво – червоного. У 1-ший день, він, як правило, з'являється за вухами і поширюється на обличчя. На 2-гий день висип покриває увесь тулуб (груди, живіт, спина), а на 3-тій день з'являється на руках і ногах. Період висипання триває 4 – 5 днів.

Кір може викликати такі ускладнення: запалення горла, трахей, бронхів, легень, вух, слизових оболонок порожнини рота, кишок, шкіри, запалення рогівки, очей, оболонок мозку.

Не ускладнений кір непотребує особливого лікування. Головним у лікуванні хворого на кір є дотримання правильного режиму, догляд, повноцінне харчування.

Батьки повинні знати, що при лікуванні дитини в домашніх умовах необхідно забезпечити максимальний спокій і постільне утримання протягом усього періоду підвищення температури і в перші 2 – 3 дні після її нормалізації, а також негайно викликати лікаря до дому.

У нашій країні проводиться щеплення проти кору шляхом введення корової вакцини вже з 12-цяти місячного віку. При своєчасному застосуванні профілактичних щеплень в організмі дитини виробляються антитіла (проти вірусу кору), що можуть захистити дитину від захворювання на кір. Якщо прищеплений і захворів на кір, то перебіг його як правило легший.

У нашему районі захворювання на кір у квітні місяці даного року зареєстровано у 9-ти випадках. Вікова структура захворілих є слідуючою: 4 дорослих віком від 18 до 30 років та 5 дітей від 1 до 5 років. Дане захворювання спостерігалось в селах: Раків – Ліс, Залазъко, Осівці, Грудки, Видерта, Малі - Голоби, Верхи. Враховуючи велику міграцію населення, захворювання може розповсюдитись і в інші населені пункти району.

Тому при появі перших ознак захворювання звертайтесь до лікаря, виконуйте його поради, обмежте спілкування – бережіть своє здоров'я і здоров'я оточуючих, обов'язково проводьте профілактичні щеплення, що є запорукою того, що ви не будете хворіти на цю небезпечну хворобу.

Анатолій Овсієнко
Лікар – інфекціоніст ЦРЛ

Кір – одне з найрозповсюдженіших гострих інфекційних захворювань дитячого віку, а в даний час і серед дорослого населення. Джерелом зараження є хвора людина, частіше дитина з першого дня захворювання. Якщо кір перебігає з ускладненнями, то хворий може бути джерелом зараження протягом 10 днів з моменту появи висипу.

До кору існує загальна сприйнятливість. Із 100 здорових дітей, котрі спілкуються із хворим, можуть захворіти 95.

З моменту зараження до появи перших ознак проходить інкубаційний період тривалістю до 17 – 18 днів, частіше 10 – 12.

Після тривалого періоду настає катаральний, що триває 3 – 4 дні. Основними ознаками його є підвищення температури, кашель, нежить, чхання, захриплість голосу, почервоніння очей, слізозотеча, світобоязнь. Дитина стає вередливою, подразливою, плаксивою, погано їсть, спить. При типовій формі кору через 1 – 2 дні з'являється дуже важлива для ранньої діагностики захворювання ознака, характерна для кору – дрібні плями білувато – сіруватого кольору, що розміщуються на слизових оболонках щік, губ, іноді вій. Температура через 1 – 2 дні може знизитись, а на 4 – 5 день відпочатку хвороби знову підвищиться. Разом з цим виявляється наступний цикл хвороби – в період висипання. Висип – плямисто папульозний (плями немовби здіймаються над поверхнею) різного кольору – від блідо – рожевого до яскраво – червоного. У 1-ший день, він, як правило, з'являється за вухами і поширюється на обличчя. На 2-гий день висип покриває увесь тулуб (груди, живіт, спина), а на 3-тій день з'являється на руках і ногах. Період висипання триває 4 – 5 днів.

Кір може викликати такі ускладнення: запалення горла, трахей, бронхів, легень, вух, слизових оболонок порожнини рота, кишок, шкіри, запалення рогівки, очей, оболонок мозку.

Не ускладнений кір непотребує особливого лікування. Головним у лікуванні хворого на кір є дотримання правильного режиму, догляд, повноцінне харчування.

Батьки повинні знати, що при лікуванні дитини в домашніх умовах необхідно забезпечити максимальний спокій і постільне утримання протягом усього періоду підвищення температури і в перші 2 – 3 дні після її нормалізації, а також негайно викликати лікаря до дому.

У нашій країні проводиться щеплення проти кору шляхом введення корової вакцини вже з 12-цяти місячного віку. При своєчасному застосуванні профілактичних щеплень в організмі дитини виробляються антитіла (проти вірусу кору), що можуть захистити дитину від захворювання на кір. Якщо прищеплений і захворів на кір, то перебіг його як правило легший.

У нашему районі захворювання на кір у квітні місяці даного року зареєстровано у 9-ти випадках. Вікова структура захворілих є слідуючою: 4 дорослих віком від 18 до 30 років та 5 дітей від 1 до 5 років. Дане захворювання спостерігалось в селах: Раків – Ліс, Залазъко, Осівці, Грудки, Видерта, Малі - Голоби, Верхи. Враховуючи велику міграцію населення, захворювання може розповсюдитись і в інші населені пункти району.

Тому при появі перших ознак захворювання звертайтесь до лікаря, виконуйте його поради, обмежте спілкування – бережіть своє здоров'я і здоров'я оточуючих, обов'язково проводьте профілактичні щеплення, що є запорукою того, що ви не будете хворіти на цю небезпечну хворобу.

Анатолій Овсієнко
Лікар – інфекціоніст ЦРЛ